

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-8-66 530070

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE (78) 37-20-56

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

1er Supplément au bulletin N° 71 d'Août 1966

25 Août 1966

Page 31

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS

TAVELURE SUR POIRES TARDIVES ET SUR POMMES - MALADIES DE CONSERVATION - Contre ces diverses maladies qui ne sont pas toujours apparentes à la récolte, effectuer, environ 15 jours avant celle-ci une application à l'aide d'un des produits conseillés contre les tavelures. Ce traitement devra être renouvelé au dernier moment avec un produit ne tachant pas les fruits, au cas où le fongicide aurait été entre temps entraîné par les pluies.

CARPOCAPSE ET TORDEUSE ORIENTALE (poires et pommes) l'extension à de nouvelles régions du traitement contre la 2ème génération du carpocapse ne s'impose pas.

En revanche dans les régions où de tels traitements ont déjà été conseillés, la protection à l'aide d'un produit également efficace contre la tordeuse orientale devra être assurée jusqu'au 12 septembre. Au-delà de cette date, seule la Tordeuse orientale restera éventuellement à combattre.

En pépinières, à l'intention des intéressés qui n'auraient pas encore appliqué le traitement des écussons, nous signalons que l'azinphos à 40 gr/hl de matière active et le mévinphos à 50 gr/hl de m.a. sont également homologués pour cet usage.

MOUCHE MEDITERRANEENNE DES FRUITS - L'activité de cet insecte s'intensifie et la répétition des traitements s'avère plus nécessaire que jamais, principalement à proximité des villes.

:POU DE SAN JOSE (zones contaminées et de protection)

: Nous rappelons que le second traitement contre la 2ème génération devra être :appliqué environ 3 semaines après le premier

MINEUSE ELARGIE (Stigmella) sur feuilles de pommier - Dans la zone contaminée au Nord de Lyon, un traitement contre la 4ème Génération devra être appliqué autour du 30 Août.

CULTURES DIVERSES

MILDIOU DE LA TOMATE - en raison de la sécheresse persistante, le prochain traitement ne sera nécessaire que dans les 4 jours après la prochaine phase humide (pluie suivie d'humidité prolongée).

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

Le Contrôleur Chargé des
Avertissements Agricoles

A. PITHIoud

P. LATARD

Imprimerie de la Station RHONE-ALPES
Directeur Gérant : L. BOUYX

7451